

КУКУРУДЗЯНИЙ СТЕБЛОВИЙ МЕТЕЛИК (*Ostrinia nubilalis* Hbn.)

Довжина тіла дорослої особини 13-15 мм, розмах крил 23-32 мм, забарвлення варіює від блідо - жовтого до світло - коричневого (самці менших розмірів мають темніше забарвлення, ніж у самок), з хвилястими смугами на крилах.

Довжина дорослої личинки 20-28 мм, від сірого до світло - коричневого чи рожевого кольору, на спині на кожному сегменті у передній частині є низка з чотирьох плям, за ними слідує дві маленькі плями у задній частині, кожна пляма має щетинки, черевна сторона тіла кремового кольору без позначень.



Гусениці проникають у черешки листя, стебла, пошкоджують волоть кукурудзи і заповзають в обгортку качанів, пошкоджуючи їх.

У стеблах гусениця прогризає ходи - направлені назовні.

На кукурудзі гусениці легко пересуваються між рослинами.

Пошкоджені стебла розламуються або висихають, урожай насіння зменшується, хвороби легше вражають рослини.



Агротехнічні заходи:

- оранка на глибину 20 см;
- подрібнення стебла (місце зимівлі личинок);
- зрізання стебел близько до ґрунту під час збору врожаю;
- регулювання строку сівби (на площах, для яких характерна поява не одного покоління кукурудзяного стеблового метелика, ранній посів кукурудзи може сприяти уникненню значної шкоди для качанів).

**Державна установа
"Тернопільська обласна
фітосанітарна лабораторія"
м. Тернопіль,
вул. Текстильна, 6,
тел. (0352) 22-36-27
mail: laboratory@karantin.te.ua
www.karantin.te.ua**