

Повитиця Лемана - *Cuscuta Lehmanniana* Bre.



Географічне поширення: *C. Lehmanniana* поширена у всіх країнах Середньої Азії. В Україні вид поширений в АР Крим та Луганській області.

Культури, на яких паразитує: абрикоси, алича, айва, вишня, гранат, груша, ожина, малина, персики, сливи, смородина, черешні, яблуні та багато інших видів лісових, декоративних і трав'янистих рослинах (всього близько 218 видів).

Морфологічні та деякі біологічні особливості: повитиця Лемана – однорічна паразитна рослина. Стебло шнуроподібне, розгалужене, червонувате або жовтувате з яскраво вираженими червоними горбиками. Квітки червоні або рожеві. Плід – овальна коробочка із залишками віночка на верхівці. Насіння жовте або коричневе, овальне, з одного боку округле, з іншого трикутногранне, з яскраво вираженим носиком.

Шкодочинність *C. Lehmanniana* надзвичайно висока. Вона полягає в значному зниженні врожайності сільськогосподарських культур, зниженні якості врожаю, засміченні насінневого матеріалу, погіршенні якості кормів, негативному впливі на здоров'я тварин.

При виявленні цієї небезпечної рослини звертайтеся в Державну установу “Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія”

46020 м. Тернопіль,
вул. Лук'яновича, 3А

тел./факс 22-36-27, E-mail: fitolaboratory.ternopil@gmail.com