

Особливості вирощування озимого часнику

Посадка часнику восени здійснюється із другої половини вересня до середини жовтня, щоб він успів до холодів утворити міцну кореневу систему, що проникає у глибину на 10 см., але не встиг би рушити в ріст. В другій половині жовтня та першій декаді листопада можна садити часник, якщо осінь тепла і тривала.

Ґрунт для часнику потрібний родючий, але найкраще росте та культура у суглинку. Ґрунт не повинен бути сухим, проте уникайте висаджування часнику у низинах, де може скупчуватися тала і дощова вода. Найкращими попередниками для часнику є будь-яка капуста, кабачки, гарбузи, боби, горох і сидерати, найгіршими попередниками є цибуля, огірки, морква, помідори і власне часник.

Озимий часник висаджують найбільші зубці на відстані 12-15 см. один від одного, дрібніші на відстані 8-10 см. А глибина озимого часнику має бути 15-20 см., міжряддя 45 см. Мульчування ділянки сухим торфом або сумішшю землі з тирсою на зиму обов'язкове, мульча захищає часник від морозів, і її шар має бути не тонше 2 см. Якщо вдарять дуже сильні морози, а снігу не буде, накрийте ділянку плівкою, або руберойдом, які можна буде зняти коли почне падати сніг. Під сніговим покривом озимий часник здатен витримати двадцятиградусні морози.

Догляд за часником полягає в прополюванні, розпушуванні ділянки і підживленні, регулярному поливі. Слід обов'язково видаляти стрілки часнику, як тільки вони утворюються. Навесні, як тільки з'являються сходи, зелений часник підживляють азотними добривами (коров'яком або сечовиною) через два тижні удобрення часнику проводять повторно. Всього за сезон досить вносити підживлення на ділянку з часником чотири рази.

Часник поражається хворобами та шкідниками. З хвороб найнебезпечіші біла шийкова і сіра гниль, гелмінтоспороз, фузаріоз, жовтяниця, несправжня борошниста роса (або пероноспороз) мозаїка, іржа і трахеомікоз. Несправжня борошниста роса або пероноспороз небезпечна хвороба часнику, що викликається паразитичними грибами класу фікоміцетів сімейства пероноспорових. Розвитку хвороби в першу чергу сприяють підвищення вологості повітря і висока температура. Спосіб боротьби: знищення заражених листків. Із шкідників найчастіше завдають часнику шкоди цибульний прихованохоботник, тютюновий трипс, стеблова нематода, цибулина міль і довгоніжки. Цибулева міль – невеликий нічний метелик до 1,5 см розмаху крил, передні крила коричневі з білими цятками. Гусениця молі вгризається в м'якоті листка, не пошкоджуючи шкірку. У тканині листка утворюються ходи. Пошкодження на листках звичайно добре помітні. Спосіб боротьби: своєчасно боротися з бур'янами та дотримуватися сівозміни.

Перед тим, як обробляти часник інсектицидом або фунгецидом, згадайте проте, що головка часнику вбирає в себе, як поживні речовини так і отрути, які ви потім вживете в їжу. Запорука багатого врожаю якісного часнику є

дотримування сівозміни і агротехнічних вимог культури не висаджуйте часник на колишню грядку доки не мине 4- 5 років .

Збір урожаю озимого часнику в кінці липня або початок серпня. Оптимальна температура зберігання для часнику 2 -4 С, вологість для зберігання часнику 60-80 С.

Районовані сорти озимого часнику Богусловський, Комсомолец - це холодостійкі сорти.

Часник культура, яка не вимагає особливих зусиль при вирощуванні.

Головне , приділити увагу часниковій грядці і в підсумках отримаєте багатий урожай корисного овочу.

Головний фахівець-агроном
відділу фітосанітарних процедур
Державна установа
«Тернопільська обласна
фітосанітарна лабораторія»
Чубко М.І.